

КРАТЪКЪ СПИСЪКЪ НА ЩИТОНОСНИТЪ ВЪШКИ (*Coccidae, Rhynchota*) ВЪ БЪЛГАРИЯ

Отъ П. Чорбаджиевъ

VERZEICHNIS DER SCHILDLÄUSE (*Coccidae, Rhynchota*) IN BULGARIE

Von P. Tschorbadjiew

Семейството щитonosни въшки (*Coccidae*) обхваща едни отъ най-малкитѣ насѣкоми отъ разряда на хоботнитѣ (*Rhynchota*). Макаръ и твърде разпространени и съ голѣмо стопанско значение, поради тѣхната твърде незначителна величина и външенъ видъ, тѣ не привличатъ вниманието на ентомологитѣ-систематици, по която причина това семейство у насъ не е проучено, макаръ и само по отношение на неговия видовъ съставъ. И въ систематичната литература по насѣкомната фауна на България нѣма нищо писано върху това семейство. Въ приложно-ентомологичната литература на България, сжщо така нѣма специална публикация върху нашитѣ щитonosни въшки. Само отдѣлни, кратки съобщения сж дадени за десетина вида щитonosни въшки, голѣмата частъ отъ които сж съобщени отъ насъ, въ наши публикации, съвмѣстно съ други вредни насѣкоми. При изучаване на различни вредни насѣкоми по културнитѣ растения въ България, ние често попадахме и на различнитѣ щитonosни въшки, срѣщащи се въ страната. Голѣма частъ отъ намѣренитѣ видове опредѣляхме сами, съ помощта на наличната специална литература. Но поради трудността, която представлява опредѣлянето на видоветѣ отъ това семейство и мъжното различаване на сроднитѣ видове, за сигурностъ, ние изпратихме материалъ и до различни специалисти по (*Coccidae*), а именно, на г. г. Hermann Wüpp въ Германия, W. Kneschtel въ Ромъния и до *British museum* въ Лондонъ, чрезъ А. К. Marshall, на които тукъ изказвамъ сърдечна признателностъ. Макаръ че опредѣлянето на събранитѣ щитonosни въшки се направи още преди 7 години, публикуването на видоветѣ правиме сега.

Долупредставениятъ списъкъ обхваща 23 вида. Той е далечъ непълненъ. Събранитѣ отъ овошнитѣ дървета щитonosни въшки, вѣроятно, сж почти всички видове, които се срѣщатъ по тѣхъ въ България. Но видоветѣ, живущи по горскитѣ и по парковитѣ дървета и храсти, както и тия по украснитѣ растения, сж сравнително слабо застъпени. Все

пакъ, макаръ и непълненъ, поради голѣмото економическо значение, което иматъ тѣзи насѣкоми за културнитъ растения, намираме за необходимо и полезно да дадемъ този списъкъ.

Coccinae

1. *Pseudococcus citri* Risso (*Pseudococcus vitis* Nied). — Намѣрена е само по лозитъ при Ивайловградъ, масово размножена.

2. *Gossiparia spuria* Modeer. — Намѣрена е по брѣста (*Ulmus*), въ околността на София и други мѣста, не често.

3. *Fonscolombea fraxini* Kalt. (*Pseudohermes fraxini* Kalt.). — Намѣрена е въ България по ясена, но безъ определено мѣстонаходище. Предполагаме да е изъ околноститъ на София.

Lecaninae

4. *Eulecanium corni* Bouché. (Сливовъ щитоносна въшка) — Най-разпространенъ видъ отъ всички щитоносни въшки изъ цѣлата страна. Срѣща се по всички почти овощни дървета, по много паркови и горски дървета и храсти и по други растения, като много често се появява масово и причинява голѣми поражения. Най-голѣми повреди причинява на сливитъ, ясена, акациитъ, маслодайната роза, по-слаби — на черешитъ и прасковитъ.

Eulecanium corni ssp. *rabiniarum* Marchall. — Този подвидъ, намиранъ по акациитъ, е видоизменение по форма и цвѣтъ на типичната форма *E. corni*, което е свойствено на този видъ, когато преминава по други растения.

6. *Eulecanium persicae* F. — Намирана е единично по праскови и черници отъ различни мѣста.

7. *Eulecanium (Physokermes) coryli* L. — Намирана е по розитъ и овощнитъ дървета, понѣкога се смѣсва съ *E. corni*.

8. *Eulecanium pulchrum* King. — По джбовитъ гори (*Quercus pedunculata*) около с. Дерелий, Карловско, е намирана често.

9. *Sphaeralecanium prunastri* F. — Намирана е по сливитъ, черешитъ и прасковитъ отъ Сливенъ, София, Карлово, Варна, Плѣвенъ и другаде. Понѣкога се появява въ голѣми количества и причинява голѣми повреди на тѣзи дървета.

10. *Pulvinaria betulae* L. — Отъ различни мѣста изъ страната по лоза, дюля и круша, но почти винаги въ ограничени количества.

Diaspinae

11. *Saissetia hemisphericum* Targ. — Срѣща се по аспарегуситъ изъ жилищата и цвѣтарницитъ.

12. *Aspidiotus hederale* Vall. — По зокумитъ и палмитъ повсемѣстенъ видъ и имъ причинява голѣми поражения.

13. *Aspidiotus ostreaeformis* Curt. — Намирана по всички овощни видове, по брѣста, ясена, джба, бука, липата и др., често масово и причинява голѣми поражения. Отъ овощнитъ дървета най-много страдатъ крушитъ и сливитъ. Повсемѣстенъ.

14. *Diaspis leperii* Sign. — Повсемѣстно разпространена по овощнитъ и др. дървета, често съвмѣстно съ *Aspidiotus ostreaeformis* и причинява голѣми повреди главно по крушитъ и сливитъ.

15. *Chrysomphalus aonidum* L. — По лимонитъ, внасяни отъ другитъ страни.

16. *Aonidiella aurantii* Mask. — По лимонитъ, внасяни отъ другитъ страни.

17. *Leucaspis löwi* Golv. — Намирана е по иглитъ на бора около София и по различни естествени борови насаждения.

18. *Parlatoria zizyphi* Luc. — По внасянитъ отъ другитъ страни лимони.

19. *Lepidosaphes ulmi* (*Mytilaspis pomorum*). — Повсемѣстна по овощнитъ дървета, ясена, върбитъ, тополитъ, брѣста, джба, бука и др. Най-много страдатъ ясенъ, върби, тополи и глогъ, а отъ овощнитъ — ябълка, круша и слива.

20. *Lepidosaphes citricola* Pack. (*pinnaeformis* Bouché). — По внасянитъ отъ другитъ страни лимонови плодове.

21. *Aulacaspis rosae* Bouché. — Намирана е не често по кората на розитъ отъ София, Сливенъ, Казанлъкъ и с. Дириний, Карловско.

22. *Chionaspis salicis* L. — Срѣща се по върбитъ и тополитъ навсѣкжде изъ страната, понѣкога се размножава масово и причинява значителни повреди по тѣзи дървета.

23. *Chionaspis evonymi* Comst. — Намирана е по *Evonymus*-а навсѣкжде въ страната, често масово.